



SWE

Preparación para la ecografía endoscópica superior

Dirección: Hospital

Por favor, consulte la Carta de ubicación del procedimiento

Para confirmar su cita, favor de marcar: 505-999-1600 EXT 1631

CARGO POR NO PRESENTACIÓN: A cualquier paciente que no acuda a su procedimiento programado se le cobrará un honorario médico de \$50.00 a través de nuestro consultorio. Tenga en cuenta que el hospital podría cobrar un cargo adicional no relacionado con nuestro consultorio. Este cargo debe abonarse antes de reprogramar cualquier cita.

Las siguientes instrucciones son instrucciones específicas de su médico. Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar una preparación exitosa.

Cancelaciones: Deben realizarse con 4 días hábiles de anticipación a su procedimiento programado. Cualquier cancelación realizada con menos de 4 días hábiles de anticipación.

POR FAVOR, REVISE LAS INSTRUCCIONES **AL MENOS UNA SEMANA ANTES** DEL PROCEDIMIENTO. USE ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y **NO LAS INCLUIDAS CON EL POLIETILENGLICOL 3350 OTC O EL ENVASE MIRALAX.**

Es importante que sigas estas instrucciones cuidadosamente y completes toda la preparación para garantizar la limpieza más efectiva.

- Si está tomando anticoagulantes y NO se lo comentó a su médico al programar el procedimiento, **llámenos al menos 5 días antes de comenzar la preparación.** Estos incluyen, entre otros, Coumadin (warfarina), Plavix (clopidogrel), Xarelto (rivaroxabán), Pradaxa (dabigatrán), Eliquis (apixabán), Arixtra (fondaparinux) y Effient (prasugrel).
- Si está tomando insulina Y esto NO se discutió con el consultorio de su médico al momento de programar el procedimiento, llame al médico que le recetó la insulina al menos 5 días ANTES de comenzar la preparación.
- Debe suspender cualquier suplemento de hierro (incluidos los multivitamínicos) durante 7 días ANTES del procedimiento.
- Si está tomando alguno de los siguientes **medicamentos GLP-1:** Dulaglutida (Trulicity), Liraglutida (Saxenda), Exenatida (Byetta, Bydureon Bcise), Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Reybelsus), Lixisenatida (Adlyxin), Albiglutida (Tanzeum). **El incumplimiento de esta instrucción resultará en la cancelación del procedimiento y el cobro de todos los cargos por cancelación.**
- **SI ES DIABÉTICO,** NO tome sus pastillas para la diabetes la noche anterior ni el día del procedimiento.
- **Debe continuar tomando todos** sus demás medicamentos a diario antes del procedimiento. Puede tomarlos con un pequeño sorbo de agua el mismo día del procedimiento.
- Puede continuar tomando aspirina, Tylenol y cualquier AINE (ibuprofeno, Motrin, Aleve, naproxeno, Celebrex, Mobic).
- Por favor, planifique que alguien lo lleve a casa después del procedimiento. **No podrá conducir usted mismo. No podrá tomar un Uber, Lyft, taxi ni transporte público para regresar a casa** después del procedimiento sin un acompañante adulto.

7 días antes de su procedimiento

Notas especiales:

Infórmenos si está tomando alguno de los siguientes anticoagulantes: Plavix, Coumadin, Effient, Pradaxa, Eliquis, Xarelto u otros medicamentos anticoagulantes.

ALTO:

Suplementos de hierro o vitaminas que contengan hierro

ALTO:

Suplementos de aceite de pescado, aceite de krill o aceite de tiburón.

Procedimiento matutino

**NO CONSUMIR
ALIMENTOS SÓLIDOS**

**NO CONSUMIR
ALCOHOL**

Sólo líquidos claros

Desde el momento en que te despiertas hasta después del procedimiento.

Tome sus medicamentos al menos 2 horas antes del procedimiento con un pequeño sorbo de agua.

No coma ni beba nada (ni líquidos) después de la medianoche de la noche anterior al procedimiento.

No omita los medicamentos para el corazón, la presión arterial o las convulsiones.

procedimiento de la tarde

Puede tomar un desayuno líquido claro. **No consumir alimentos sólidos, leche ni productos lácteos.**

Alcohol is not permitted

"CLEAR LIQUIDS"

INCLUDE:

- Strained fruit juice without pulp (apple, white grape, lemonade)
- Water, tea, coffee (without milk or non-dairy creamer)
- Clear broth or chicken, beef or vegetable bouillon
- Plain jello or ice popsicles

Do not have anything solid to eat or drink (no liquids) for **8 hours** prior to your procedure.

No gum, mints, candy or tobacco products.

*** Detalles de la dieta de líquidos claros: NO ROJO O PURPURA SIN LÁCTEOS**

Aprobado

- Refrescos (soda), café, té jugos claros, las aguas de la aptitude
- Paletas de helado sin pulpa
- Caldo de Pollo, verduras y de carne
- Gelatina

Evitar

- No leche/lácteos
- No jugos con pulpa
- No **ROJO** or **PURPURA**



You will need your current insurance card, picture ID and copayment.