



Preparación para la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP)

Dirección: Hospital

Por favor, consulte la Carta de ubicación del procedimiento

Para confirmar su cita, favor de marcar: 505-999-1600 EXT 1631

CARGO POR NO PRESENTACIÓN: A cualquier paciente que no acuda a su procedimiento programado se le cobrará un honorario médico de \$50.00 a través de nuestro consultorio. Tenga en cuenta que el hospital podría cobrar un cargo adicional no relacionado con nuestro consultorio. Este cargo debe abonarse antes de reprogramar cualquier cita.

Las siguientes instrucciones son instrucciones específicas de su médico. Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar una preparación exitosa.

Cancelaciones: Deben realizarse con 4 días hábiles de anticipación a su procedimiento programado. Cualquier cancelación realizada con menos de 4 días hábiles de anticipación.

POR FAVOR, REVISE LAS INSTRUCCIONES **AL MENOS UNA SEMANA ANTES** DEL PROCEDIMIENTO. USE ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y **NO LAS INCLUIDAS CON EL POLIETILENGLICOL 3350 OTC O EL ENVASE MIRALAX.**

Es importante que sigas estas instrucciones cuidadosamente y completes toda la preparación para garantizar la limpieza más efectiva.

- Si está tomando anticoagulantes y NO se lo comentó a su médico al programar el procedimiento, **llámenos al menos 5 días antes de comenzar la preparación.** Estos incluyen, entre otros, Coumadin (warfarina), Plavix (clopidogrel), Xarelto (rivaroxabán), Pradaxa (dabigatrán), Eliquis (apixabán), Arixtra (fondaparinux) y Effient (prasugrel).
- Si está tomando insulina Y esto NO se discutió con el consultorio de su médico al momento de programar el procedimiento, llame al médico que le recetó la insulina al menos 5 días ANTES de comenzar la preparación.
- Debe suspender cualquier suplemento de hierro (incluidos los multivitamínicos) durante 7 días ANTES del procedimiento
- Si está tomando alguno de los siguientes **medicamentos GLP-1:** Dulaglutida (Trulicity), Liraglutida (Saxenda), Exenatida (Byetta, Bydureon Bcise), Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Reybelsus), Lixisenatida (Adlyxin), Albiglutida (Tanzeum), **debe tomar SOLO líquidos claros el día anterior a su procedimiento programado, según lo indique la preparación. Debe suspender los medicamentos GLP-1 1 semana antes del procedimiento. El incumplimiento de esta instrucción resultará en la cancelación del procedimiento y el cobro de todos los cargos por cancelación.**
- **SI ES DIABÉTICO, NO** tome sus pastillas para la diabetes la noche anterior o el día de la colonoscopia.
- **Debe continuar tomando todos** sus demás medicamentos todos los días antes de la colonoscopia. Puede **tomarlos con un pequeño sorbo de agua** el día de la colonoscopia.
- Puede continuar tomando aspirina, Tylenol y cualquier AINE (ibuprofeno, Motrin, Aleve, naproxeno, Celebrex, Mobic).
- Por favor, planifique que alguien lo lleve a casa después del procedimiento. **No podrá conducir usted mismo. No podrá tomar un Uber, Lyft, taxi ni transporte público para regresar a casa** después del procedimiento sin un acompañante adulto.

7 days prior to procedure

Notas especiales:

Infórmenos si toma alguno de los siguientes anticoagulantes: Plavix, Coumadin, Effient, Pradaxa, Eliquis, Xarelto u otros medicamentos anticoagulantes. Necesitará su tarjeta de seguro vigente, una identificación con foto y el copago.

Detener:

Suplementos de hierro o vitaminas que contienen hierro

Detener:

Suplementos de aceite de pescado, aceite de krill o aceite de tiburón.

Morning procedure

SIN ALIMENTOS SÓLIDOS

SIN ALCOHOL

Sólo líquidos claros

Desde el momento en que te despiertas hasta después del procedimiento.

Tome sus medicamentos al menos 2 horas antes del procedimiento con un pequeño sorbo de agua.

No coma ni beba nada (ni líquidos) 8 horas antes del procedimiento.

No omita los medicamentos para el corazón, la presión arterial o las convulsiones.

Afternoon procedure

Puedes tomar un desayuno líquido claro. **No** alimentos sólidos, leche ni productos lácteos.

No se permite el alcohol

‘LÍQUIDOS CLAROS’ INCLUYEN:

- Zumo de fruta colado sin pulpa (manzana, uva blanca, limonada)
- Agua, té, café (sin leche ni crema vegetal)
- Caldo claro o consomé de pollo, res o verduras
- Gelatina simple o paletas de hielo

No coma ni beba nada sólido (ni líquidos) durante las 8 horas previas al procedimiento.

Sin chicles, mentas ni caramelos.

Detalles de la dieta de líquidos claros: **NO Rojo** ni **Morado**. **SIN LÁCTEOS**

Aprobar

- Refrescos, café, té, jugos claros, aguas fitness.
- Paletas sin pulpa.
- Caldo de pollo, verduras y carne, Gelatina.

Evitar

- Sin lácteos
- No jugos con pulpa
- **NO Rojo** ni **Morado**

