



(EGD)Endoscopia

Southwest Endoscopy

7788 Jefferson St NE, Albuquerque, NM 87109

Please call to confirm appointment 505-999-1600

Las citas canceladas o perdidas con menos de 4 días hábiles de anticipación resultarán en un cargo de \$200, de acuerdo con las políticas vigentes de la oficina.



To make your check-in easier, scan the QR code to review all required forms before your procedure, including informed consent, patient rights, and anesthesia consent. You will sign these at check-in. If you're unable to scan, the forms will be available when you arrive.

Estas son las instrucciones específicas de su médico. Siga estas indicaciones cuidadosamente para asegurar una preparación exitosa.

Importante: Revise esta guía al menos una semana antes de su procedimiento. No siga las instrucciones que vienen en la botella de Polyethylene Glycol 3350 de venta libre o Miralax—utilice únicamente las instrucciones proporcionadas aquí. Es fundamental seguir estas indicaciones y completar todo el proceso de preparación para lograr una limpieza intestinal óptima.

Anticoagulantes (Medicamentos para adelgazar la sangre): Si está tomando anticoagulantes y esto no se discutió con el consultorio de su médico al momento de programar el procedimiento, por favor llámenos al menos 5 días antes de comenzar la preparación. Estos medicamentos incluyen, pero no se limitan a: Coumadin (Warfarina), Plavix (Clopidogrel), Xarelto (Rivaroxabán), Pradaxa (Dabigatrán), Eliquis (Apixabán), Arixtra (Fondaparinux), y Effient (Prasugrel).

Pacientes que usan insulina: Si está usando insulina y esto no se discutió durante la programación, debe comunicarse con su médico recetante al menos 5 días antes de comenzar la preparación.

Suplementos de hierro: Deje de tomar cualquier suplemento de hierro, incluidos los que se encuentran en multivitaminas, 7 días antes de su procedimiento.

Medicamentos GLP-1: Si está tomando medicamentos GLP-1 como Dulaglutida (Trulicity), Liraglutida (Saxenda), Exenatida (Byetta, Bydureon Bcise), Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), Lixisenatida (Adlyxin), o Albiglutida (Tanzeum), NO DEJE de tomarlo y deberá tener una dieta de líquidos claros el día antes del procedimiento.

Medicamentos para la diabetes: Si es diabético, no tome sus pastillas para la diabetes la noche anterior ni el día de la endoscopia.

Todos los demás medicamentos: Debe continuar tomando todos sus demás medicamentos recetados diariamente antes del procedimiento. El día del procedimiento, puede tomarlos con un pequeño sorbo de agua.

Analgésicos (medicamentos para el dolor): Puede continuar tomando aspirina, Tylenol y antiinflamatorios no esteroides (AINEs) como ibuprofeno, Motrin, Aleve, Naproxeno, Celebrex o Mobic.

Requisito de transporte: Debe hacer arreglos para que un adulto responsable lo lleve a casa después del procedimiento. No se le permitirá manejar usted mismo. Tampoco podrá usar Uber, Lyft, taxi o transporte público a menos que esté acompañado por un adulto.

7 días antes del procedimiento	Día del procedimiento
Notas Especiales: Es de suma importancia informarnos si actualmente está bajo tratamiento con alguno de los siguientes anticoagulantes: Plavix, Coumadin, Effient, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, o cualquier otro medicamento con efectos anticoagulantes. Se requiere suspender la ingesta de suplementos de hierro o cualquier vitamina que contenga hierro. Asimismo, debe suspender la toma de suplementos de aceite de pescado, aceite de krill o aceite de tiburón.	Instrucciones para Procedimientos en la Mañana (antes de las 12:00 p.m.): - Absténgase de consumir alimentos sólidos y bebidas (excepto líquidos claros) desde la medianoche anterior a su procedimiento. - Continúe con la toma de sus medicamentos habituales al menos 2 horas antes del procedimiento, utilizando únicamente pequeños sorbos de agua para su ingesta. Es importante no interrumpir la medicación para el corazón, la presión arterial o las convulsiones. - Evite completamente chicles, mentas, dulces, y cualquier producto de tabaco. Instrucciones para Procedimientos en la Tarde (después de las 12:00 p.m.): - Se permite consumir un desayuno compuesto exclusivamente de líquidos claros. Debe evitarse la ingesta de alimentos sólidos, leche y productos lácteos, así como el alcohol. - No ingiera alimentos sólidos ni bebidas (excluyendo líquidos claros) durante las 8 horas previas a su procedimiento. La restricción incluye chicles, mentas, dulces y productos de tabaco. - Administre sus medicaciones habituales con pequeños sorbos de agua (no más de 2 onzas) al menos 2 horas antes del procedimiento. - Asegúrese de no omitir aquellas prescritas para el corazón, la presión arterial o las convulsiones.

Clear Liquid Diet Details: **NO RED** or **PURPLE**. NO DAIRY

Approve

- Sodas, coffee, tea clear juices, fitness waters.
- Popsicles without pulp.
- Chicken, vegetable, and beef broth, Gelatin.

Avoid

- No milk/dairy
- No juices with pulp
- No **RED** or **PURPLE**



PREPARACIÓN PARA UNA EGD

Todos los pacientes deben completar su registro para el procedimiento 60 minutos antes de la hora programada. En caso de que su procedimiento esté programado antes de las 7 a.m., por favor regístrese a las 6:00 a.m. Nuestra oficina abre sus puertas a las 6:00 a.m. Es importante prever que la duración de su visita sea de aproximadamente 2 a 3 horas.

ES IMPORTANTE TOMAR SUS MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN ARTERIAL, LOS MEDICAMENTOS CARDÍACOS O LOS ANTICONVULSIVOS SEGÚN LO PRESCRITO, **CON UN PEQUEÑO SORBO DE AGUA (NO MÁS DE 2 OZ)**, A MÁS TARDAR 2 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO. DE NO CUMPLIR CON ESTA INDICACIÓN, SU PROCEDIMIENTO SERÁ CANCELADO. EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO, ESTÁ PROHIBIDO EL CONSUMO DE GOMA DE MASCAR, CAMELOS DUROS Y CUALQUIER PRODUCTO DE TABACO.

Debe asegurarse de que un adulto responsable (mayor de 18 años) lo acompañe para llevarlo de regreso a casa después de su procedimiento. No se le permitirá conducir, tomar un autobús o salir solo de las instalaciones. Aunque no es necesario que la persona que lo acompaña permanezca en las instalaciones durante el procedimiento, sí debe estar disponible telefónicamente. Nuestro personal contactará a su acompañante 30 minutos antes de que usted esté listo para ser dado de alta.

- Deberá presentar su tarjeta de seguro médico vigente y una identificación con fotografía, junto con el copago correspondiente.
- Si es una mujer menor de 50 años, podría ser necesario que se realice una prueba de embarazo a partir de una muestra de orina.

Si tiene preguntas sobre su preparación, comuníquese al número que aparece a continuación.

GiftHealth Patient Support Call Center:

M-F 8AM-9PM EST

Sat 8AM-2PM EST

1-833-614-4438